

臨床実習入門 本試 (2017.09.19)

問1 吐血が主訴となるのはどれか

- a 食道静脈瘤
- b 急性膵炎
- c 腸閉塞
- d 急性胆嚢炎
- e

問2 喀血が主訴となるのはどれか

- a 食道静脈瘤
- b 胃潰瘍
- c マロリーワイス
- d 気管支拡張症
- e 胃がん

問3 中枢性めまいをきたすのはどれか

- a メニエール病
- b 椎骨脳底動脈循環不全
- c 突発性難聴
- d 急性前庭神経炎
- e 良性発作性頭位変換眩暈症

問4 嘔吐を起こすことが少ないのはどれか

- a ジギタリス中毒
- b 脳浮腫
- c 甲状腺クリーゼ
- d 食道憩室
- e 糖尿病性ケトアシドーシス

問5 臓器と体表の組み合わせで正しいものはどれか

- a 脾臓—左季肋部
- b 甲状腺—甲状軟骨
- c 心尖部—左乳頭外側
- d 気管分岐部—胸骨角

- e 腎動脈分岐部一臍

問6 関節リウマチで病変が始まる部位はどれか

- a 腱
- b 骨
- c 滑膜
- d 靱帯
- e 軟骨

問7 頭痛について正しいものをすべて選べ

- a 突然発症の頭痛は頭部 CT で異常がなくても帰してはいけない
- b 片頭痛は1週間持続することもある
- c 歩行で改善がみられなければ筋緊張型頭痛の可能性は低い
- d 群発頭痛は女性に多い
- e 低血糖で頭痛をきたすことがある

問8 誤っているものはどれか

- a 脈拍は吸気時に早くなり、呼気時に遅くなる
- b オッズとは確率と 1－確率の比である
- c 尤度比とは感度と 1－特異度の比である
- d バイタルサインとは意識状態、体温、脈拍、血圧、筋力である
- e 意識障害の評価には JCS と GCS があり、外傷性脳障害をあらわすのが GCS である

問9 意識障害を起こすのはどれか

- a 痛風
- b 糖尿病
- c 骨粗鬆症
- d 変形性関節症
- e 前立腺肥大症

問10 食欲はみられるが体重が減少する疾患はどれか

- a パーキンソン病
- b うっ血性心不全
- c 2型糖尿病
- d 甲状腺機能低下症
- e 慢性閉塞性肺疾患

問11 直接ビリルビンが高値となるのはどれか

- a 無効造血
- b Crigler-Najjar 症候群
- c 移植適応の劇症肝炎
- d Rotor 症候群
- e Gilbert 症候群

問12 錐体路障害ではないのはどれか

- a Hoffmann 反射
- b Babinski 反射
- c 深部腱反射
- d Chaddock 反射
- e Wartenberg 反射

問13 呼吸困難の英語はどれか

- a dyspnea
- b hemoptysis
- c sputum
- d orthopnea
- e hoarseness

問14 体重が増加する可能性のあるものはどれか

- a 甲状腺がん
- b インスリノーマ
- c 胃がん
- d 悪性リンパ腫
- e 膵癌

問15 黄疸を起こしにくいのはどれか

- a 肝硬変
- b 肝癌
- c 脂肪肝
- d 胆管炎
- e 膵癌

問16 パーキンソン病の初期症状としてみられないのはどれか

- a 安静時振戦
- b 筋強剛
- c 無動
- d 仮面様顔貌
- e 認知症

問17 圧痕を残さない浮腫の原因となるものはどれか

- a 心不全
- b 塩分過剰摂取
- c 深部静脈血栓
- d 甲状腺機能低下症
- e ネフローゼ症候群

問18 (症例問題) 7?歳、女性。今朝、激しい頭痛で目が覚め、悪心・嘔吐があり、起き上がれなかった。発熱はなし。項部硬直あり。白血球、CRP 正常。

- a
- b
- c くも膜下出血
- d
- e 無菌性髄膜炎

問19 ?

問20 無尿をきたすのはどれか

- a 大腸癌
- b 膀胱癌
- c 子宮筋腫
- d 両側尿管結石
- e 前立腺肥大症

問21 高血圧がみられないものはどれか

- a 心タンポナーデ
- b 心筋梗塞

- c くも膜下出血
- d 脳出血
- e 脳梗塞

問22 無尿、乏尿、頻尿の組み合わせで正しいものはどれか

- a 0ml—500ml—4000ml
- b 0ml—100ml—3000ml
- c 50ml—400ml—4000ml
- d 100ml—400ml—3000ml
- e 100ml—500ml—4000ml

問23 二次性高血圧でないものはどれか

- a 睡眠時無呼吸症候群
- b 原発性アルドステロン症
- c Cushing 症候群
- d 褐色細胞腫
- e

問24 リンパ節腫脹をきたさない疾患はどれか

- a 伝染性単核球症
- b サルコイドーシス
- c 亜急性壊死性リンパ節炎
- d 白血病
- e 心筋炎

問25 繰り返すめまいと難聴とを特徴とする疾患はどれか

- a 耳硬化症
- b メニエール病
- c 前庭神経炎
- d 騒音性難聴
- e 良性発作性頭位めまい症

問26 失神発作を起こしにくいのはどれか

- a 起立性低血圧
- b 大動脈弁狭窄症
- c 僧帽弁閉鎖不全症

- d 洞機能不全症候群
- e 肥大型閉塞性心筋症

問27 失神をきたさない疾患はどれか

- a もやもや病
- b 睡眠時無呼吸症候群
- c Adams-Stokes 症候群
- d 過換気症候群
- e 起立性低血圧

問28 主症状が胸痛でないものはどれか

- a 胸膜炎
- b 自然気胸
- c 肺水腫
- d 心筋梗塞
- e 胸部解離性大動脈瘤

問29 発熱を伴わないものはどれか

- a 腎膿瘍
- b 急性腎盂腎炎
- c 急性膀胱炎
- d 急性前立腺炎
- e 急性精巣上体炎

問30 発熱患者の診療において誤っているのはどれか

- a 海外渡航歴を聴取する
- b 高齢者は易感染宿主と考える
- c 糖尿病患者は易感染宿主と考える
- d 悪寒戦慄のある時は血液培養を行う
- e 白血球が減少していれば重篤な感染症を否定できる

問31 発熱の原因として最も多いのはどれか

- a 薬剤
- b 感染症
- c 膠原病
- d 悪性腫瘍

e 良性腫瘍

問32 (高血圧の症例問題 有用な検査はどれか)

a

b 血中カテコラミン

c デキサメタゾン抑制試験

d 血中レニン

e

問33

a 器質的疾患による倦怠感は午後から夕方に起こることが多いが、うつ病などでは朝から倦怠感がみられる

b 運動時の筋では乳酸が産生され、リン酸の蓄積によって筋収縮力が低下する

c 運動時の疲労ではセロトニンが増加するが、パーキンソン病やうつ病でも髄液中のセロトニンは増加する

d 慢性疲労症候群について？

e 線維筋痛症は女性に多い

正答

問 1 a
問 2 d
問 3 b
問 4 c
問 5 d
問 6 c
問 7 a e
問 8 d
問 9 b
問 10 c
問 11 d
問 12 c
問 13 a
問 14 b
問 15 c
問 16 e
問 17 d
問 18 c
問 19 ?
問 20 d
問 21 a
問 22 d
問 23 e
問 24 e
問 25 b
問 26 c
問 27 b
問 28 c
問 29 c
問 30 e
問 31 b
問 32 ?
問 33 a→○ b→○ c→× e→○

←亢進するが病的反射ではないから？

←？

←？