

臨床実習入門本試 2018 再現問題

1. 橈骨動脈の触診について正しいものを2つ選べ

- a. 両側同時に確認する必要はない
- b.
- c. 大きく触れれば問題はない
- d. 早朝に計測するとよい
- e.

2. 非圧痕性浮腫をきたす疾患を2つ選べ

- a. リンパ浮腫
- b. ネフローゼ症候群
- c. 肝硬変
- d. 心不全
- e. 甲状腺機能低下症

3. 肺の聴診・打診について正しいものを2つ選べ

- a. 肺の正常音は鼓音である
- b. 左右差の確認が重要である
- c. 吸気時の呼吸音が重要である
- d. 部位によって音が違う
- e. 膜型とベル型の使い分けが重要である

4. 腰痛をきたさない疾患を2つ選べ

- a. 膀胱癌
- b. 狭心症
- c. 化膿性脊椎炎
- d. 大動脈解離
- e. 閉鎖孔ヘルニア

5. 関節リウマチの病変が始まる部位はどこか

- a. 滑膜
- b. 軟骨
- c. 骨
- d. 腱
- e. 靱帯

6. 重篤な脊椎疾患を疑う所見を2つ選べ

- a. 30代の腰痛
- b. 安静時に痛い
- c. 体重減少を伴う
- d. 重いものを持ったときに発症
- e. 1週間以上症状が持続する

7. バイタルサインでないものはどれか

- a. 意識状態
- b. 体温
- c. 脈拍
- d. 呼吸状態
- e. 筋力

8. 慢性肺疾患を示唆する所見はどれか

- a. ばち状指
- b. 匙状爪
- c. 腹水
- d. クモ状血管腫
- e.

9. 中枢性めまいを示唆する所見を2つ選べ

- a. 回転性めまい
- b. 嘔吐なし
- c. 垂直眼振
- d. 耳鳴りの合併
- e.

10. 反復するめまいと難聴をきたす疾患はどれか

- a. 突発性難聴
- b. メニエール病
- c. 椎骨脳底動脈循環不全
- d. 急性前庭神経炎
- e. 良性発作性頭位変換めまい症

1 1. 高リスクな失神を示唆する所見を2つ選べ

- a. 収縮期血圧 90mmHg 未満
- b. 心電図異常
- c. 起立性低血圧
- d. 消化器症状
- e.

1 2. 動悸を引き起こさない疾患はどれか

- a. 高血糖
- b. 不安神経症
- c. 心房細動
- d. バセドウ病
- e. 貧血

1 3. 痰が出ない慢性肺疾患を2つ選べ

- a. マイコプラズマ肺炎
- b. GERD
- c. 気管支喘息
- d. 肺炎
- e. DPB

1 4. 喀血を伴う疾患を2つ選べ

- a. 結核
- b. GERD
- c. 喉頭咽頭逆流症
- d. 食道憩室
- e. 気管支拡張症

1 5. 単関節炎でまず鑑別すべきものはどれか

- a. 細菌性
- b. 真菌性
- c. 変形性
- d. 関節リウマチ
- e. 痛風

16. 発熱をきたさない疾患はどれか

- a. 薬剤
- b. 胃がん
- c. SLE
- d. 橋本病
- e. 菊池病

17. CRP 正常。発熱あり。非常に強い頭痛。項部硬直有り。考えられる疾患はどれか

- a. 無菌性髄膜炎
- b. 脳腫瘍
- c. 副鼻腔炎
- d. 化膿性脊椎炎
- e. くも膜下出血

18. 若年者より高齢者に多い発熱疾患を2つ選べ

- a. 高安病
- b. 伝染性単核球症
- c. 偽痛風
- d. リウマチ性多発筋痛症
- e.

19. バセドウ病治療薬であるメギンゾールの副作用は何か

- a. 白血球減少
- b.
- c.
- d.
- e.

20. 間接ビリルビンが優位に上昇する疾患はどれか

- a. Dubin-Johnson 症候群
- b. 溶血性貧血
- c. 総胆管閉塞
- d. Roter 症候群
- e. 肝硬変

22. 重篤な頭痛を示唆する症候を2つ選べ

- a. 突然起こる激しい頭痛
- b. 閃輝性暗点
- c. においに敏感
- d. 1 日続く
- e. 四肢麻痺を伴う

23. 片頭痛の特徴で無いものを2つ選べ

- a. 両側性
- b. 嘔吐なし
- c. 拍動性
- d. 体動で増悪
- e. 1 時間持続する

24. 無尿-乏尿-多尿の組み合わせはどれか（単位は ml）

- a. 0-500-4000
- b. 0-100-300
- c. 50-400-4000
- d. 100-400-3000
- e. 100-500-4000

25. パーキンソン病に特徴的でない症状を2つ選べ

- a. 下痢
- b. レルミット徴候
- c. 仮面様顔貌
- d. 片側の安静時振戦
- e. 歯車様拘縮

26. 多発ニューロパチーをきたさない疾患を2つ選べ

- a. 脳梗塞
- b. 肺小細胞癌
- c. アミロイドーシス
- d. 糖尿病
- e. 腰椎圧迫骨折

27. 関連性が高いものを2つ選べ

- a. ビタミン B12 — 亜急性脊髄連合変性症

- b. 小刻み歩行 — パーキンソン病
- c. 糖尿病 — シャルコー・マリー・トゥース病
- d. 動揺性歩行 — 脳梗塞
- e. 痙性対麻痺歩行 — 脊髄小脳変性症

28. 痛み刺激で開眼、意味のない発声、痛み刺激に対して手で払いのける動作をする。

GCS スコアは？

- a. E3V3M4
- b. E3V2M4
- c. E2V3M3
- d. E2V2M4
- e. E2V2M5

29. 錐体路障害を示唆しない所見はどれか

- a. Chaddock 反射
- b. Babinski 反射
- c. Hoffman 反射
- d. 深部腱反射低下
- e. Wartenberg 反射

30. 血圧測定について正しいものを 2 つ選べ

- a. ベル型と膜型どちらでもよい
- b. 血圧間隙に気をつける
- c. マンシエッテはきつく巻く
- d. 聴診法による測定は左右どちらか 1 回のみ行う
- e.

31. 75 歳女性。食欲低下。腹部膨満。嘔吐あり、たまに血が混じる。考えられる疾患を 2 つ選べ

- a. 大腸癌
- b. 胃癌
- c. 十二指腸潰瘍
- d. 胆嚢炎
- e.

32. 左 CVA 叩打痛あり。CRP、カルシトニン上昇。疑う疾患はどれか、2 つ選べ

- a. 急性腎盂腎炎
- b. 急性脾炎
- c. 急性胃腸炎
- d. 急性膽囊炎
- e. 急性膀胱炎